

Zusammenfassung der Merkmale des Tierarzneimittels (SPC) Fachinformation

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Homeo Artil – Tropfen zum Eingeben für Hunde und Katzen

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZUSAMMENSETZUNG

10 ml Lösung enthalten:

Wirkstoffe:

1,666 ml Bryonia C4, 1,666 ml Apis mellifica (Bienengift) C4, 1,666 ml Dulcamara C4, 1,666 ml Colchicum autumnale C4, 1,666 ml Hypericum perforatum C4, 1,666 ml Rhus toxicodendron C4.

1 ml entspricht 38 Tropfen .

Sonstige Bestandteile:

Ethanol, Gesamtethanolgehalt 20% (v/v)

Eine vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile finden Sie unter Abschnitt 6.1.

3. DARREICHUNGSFORM

Homöopathische Arzneispezialität
Tropfen, Lösung zum Eingeben
Klare, farblose Lösung

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Zieltierarten

Hunde, Katzen

4.2 Anwendungsgebiete unter Angabe der Zieltierart(en)

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören:

- rheumatische Gelenks- und Muskelbeschwerden
- Arthrose

Die Anwendung dieses homöopathischen Mittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung. Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

4.3 Gegenanzeigen

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen (wie z. B. Bienengift) oder einem der sonstigen Bestandteile.

4.4 Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart

Keine.

4.5 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Bei längerer, nicht indizierter Anwendung von Homöopathika können Arzneimittelprüfsymptome auftreten.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren

Nicht zutreffend.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender

Nicht zutreffend.

4.6 Nebenwirkungen (Häufigkeit und Schwere)

Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Behandlung mit homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

4.7 Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode

Die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels während der Trächtigkeit und Laktation ist nicht belegt. Über die Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation entscheidet der behandelnde Tierarzt nach entsprechender Nutzen-Risiko-Bewertung.

4.8 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen

Wie bei allen Arzneimitteln können auch bei homöopathischen Arzneimitteln Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln auftreten. Wenn Homeo Artil gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

4.9 Dosierung und Art der Anwendung

Zum Eingeben.

Die Tropfen entweder pur oder mit ein wenig Wasser vermischt in das Futter geben, oder auf einem „Leckerbissen“ dem Tier eingeben.

Dosierung:

Hunde und Katzen:

10 bis 15 Tropfen morgens und abends über die Dauer von 2 bis 3 Wochen verabreichen.

Die Wirkungsdauer von Homöopathika kann individuell verschieden sein. Grundsätzlich ist die Eingabe des Tierarzneimittels bei Nachlassen der Wirkung oder bei Rückkehr der Beschwerden zu wiederholen.

Behandlungsdauer:

Bis zur vollständigen Beschwerdefreiheit.

4.10 Überdosierung (Symptome, Notfallmaßnahmen, Gegenmittel), falls erforderlich

Daten zur Überdosierung liegen nicht vor.

4.11 Wartezeit(en)

Nicht zutreffend.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

Pharmakotherapeutische Gruppe: alle übrigen therapeutischen Mittel
ATCvet-Code: QV03AX

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie bei akuten und chronischen Erkrankungen. Die Erkenntnisse über die Heilwirkung von homöopathischen Einzelmitteln, die aus dem Pflanzen-, Tier- und Mineralreich gewonnen werden, werden durch Arzneimittelprüfungen an gesunden Tieren (Arzneimittelprüfungssymptome), durch Anwendung am kranken Tier und auf Grund von Erkenntnissen der Toxikologie gewonnen. Die Zusammenfassung ergibt das Arzneimittelbild als Grundlage der homöopathischen Medizin.

Die Wirkung ist bei Übereinstimmung von Krankheitsbild und Arzneimittelbild nicht so sehr an die Dosisgröße gebunden, sondern eher an die Häufigkeit der Dosis-Wiederholung.

Im Kombinationsmittel *Homeo Artil – Tropfen für Hunde und Katzen* werden homöopathische Einzelmittel miteinander kombiniert, die vergleichbare oder einander ergänzende Anwendungsgebiete haben.

5.2 Angaben zur Pharmakokinetik

Es wurden keine pharmakokinetischen Untersuchungen durchgeführt.

Bryonia

Die Tinktur der Zaunrübe (*Bryonia*) beeinflusst das Zentralnervensystem, die Schleim- und Hirnhäute, die Serosa und das subkutane Bindegewebe. Die Hauptindikationen sind demnach Gebärmutterentzündungen, Euterentzündungen, Neuralgien, Arthritis, Gelenksrheumatismus, Fieberzustände und Koliken der glatten Muskulatur.

Apis mellifica

Die aus Honigbienen (*Apis mellifica*) zubereitete Tinktur beeinflusst das Zentralnervensystem sowie Entzündungserscheinungen mit plötzlich in der Haut auftretenden Ödemen, Entzündungen der Schleimhäute und der Serosa.

Dulcamara

Solanum dulcamara, der „Bittersüße Nachtschatten“, kann bei Koliken, Diarrhoe, Blasenkatarrh, Rheuma sowie bei zähen Schleimhautsekretabsonderungen die Selbstheilungstendenz des Organismus unterstützen.

Colchicum autumnale

Die Urtinktur der Herbstzeitlose (*Colchicum autumnale*) hat eine Beziehung zu Gicht, Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises und Arthrosen.

Hypericum perforatum

Die Tinktur von *Hypericum perforatum* (Johanniskraut) hat eine Affinität zum Zentralnervensystem sowie zu entzündlichen Prozessen. Die Hauptindikationen sind demnach Nervenentzündungen sowie rheumatisch-entzündliche Prozesse.

Rhus toxicodendron

Der Giftsumach (*Rhus toxicodendron*) zur Unterstützung der Heilungsprozesse bei subakutem oder chronischem Muskel- und Gelenkrheumatismus, Arthritis der großen Gelenke, Verrenkungen sowie Hautausschlägen verwendet werden.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Verzeichnis der sonstigen Bestandteile

Wasser, Ethanol, Gesamtethanolgehalt 20 % (v/v)

6.2 Inkompatibilitäten

Keine bekannt.

6.3 Dauer der Haltbarkeit

Haltbarkeit des Tierarzneimittels im unversehrten Behältnis: 5 Jahre

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen/ Anbruch des Behältnisses: 1 Jahr

6.4 Besondere Lagerungshinweise

Nicht über 25°C lagern.

Das Behältnis ist im Umkarton aufzubewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

6.5 Art und Beschaffenheit des Behältnisses

Rundes Braunglasfläschen (Glasart: hydrolytische Klasse III), PE-Verschluss mit Tropfeinsatz

Füllmenge: 30 ml

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung nicht verwendeter Tierarzneimittel oder bei der Anwendung entstehender Abfälle

Nicht verwendetes Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

7. ZULASSUNGSINHABER

JACOBY GM Pharma GmbH., Teichweg 2, 5400 Hallein

Tel.: 06245-8951-0

Fax: 06245-8951-68

E-Mail: zulassung@jacoby.at

8. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Z. Nr.: 8-30090

9. DATUM DER ERTEILUNG DER ERSTZULASSUNG / VERLÄNGERUNG DER ZULASSUNG

28. Juni 2005/

10. STAND DER INFORMATION

Oktober 2011

11. VERBOT DES VERKAUFS, DER ABGABE UND/ODER DER ANWENDUNG

Nicht zutreffend

12. VERSCHREIBUNGSPFLICHT/APOTHEKENPFLICHT:

Rezeptfrei und Apothekenpflichtig.