GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Siccaforte - Augengel

Wirkstoff: Carbomer

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 3 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Siccaforte - Augengel und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Siccaforte - Augengel beachten?
3. Wie ist Siccaforte - Augengel anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Siccaforte - Augengel aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST SICCAFORTE - AUGENGEL UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Siccaforte - Augengel ist ein klares, farbloses, tropffähiges Augengel, das ähnliche Eigenschaften wie die Tränenflüssigkeit des Auges besitzt. Deshalb wird Siccaforte – Augengel als Ersatz für Tränenflüssigkeit verwendet um die Reizung des Auges durch fehlende oder ungenügende Tränenproduktion („Trockene Augen“) symptomatisch zu behandeln. Siccaforte - Augengel verhindert oder verringert unangenehme Trockenheit am Auge nach dem Eintropfen bis zu 6 Stunden lang. Dadurch bessern sich gereizte, gerötete Augen.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON SICCAFORTE - AUGENGEL BEACHTEN?

Siccaforte - Augengel darf nicht angewendet werden,
wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen den Wirkstoff Carbomer oder einen der sonstigen Bestandteile von Siccaforte - Augengel sind.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Siccaforte - Augengel ist erforderlich,
- wenn Sie *Kontaktlinsenträger* sind. Während der Behandlung mit Siccaforte – Augengel sollen keine Kontaktlinsen getragen werden, da dies eventuell zu Unverträglichkeiten mit dem Linsenmaterial führen könnte. Bei Trägern weicher

Kontaktlinsen besteht die Möglichkeit der Unverträglichkeit durch die Einlagerung des Konservierungsmittels Cetrimid in die Kontaktlinsen.
- Wenn Sie Augenschmerzen, Sichtveränderung, Reizung des Auges, bleibende Augenrötung bemerken oder falls die Beschwerden sich verschlechtern oder länger als 3 Tage bestehen, brechen Sie die Anwendung ab und konsultieren Sie Ihren Arzt.

Wenn Sie erste Anzeichen von Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Bei Anwendung von Siccaforte - Augengel mit anderen Arzneimitteln
Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bislang nicht bekannt. Bei zusätzlicher Behandlung mit anderen Augentopfen beachten Sie bitte die Hinweise im Abschnitt „Wie ist Siccaforte – Augengel anzuwenden“

Schwangerschaft und Stillzeit
Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.
Über den Einsatz von Siccaforte - Augengel während der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine Erfahrungen vor. Daher sollte eine Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit nur unter strenger Indikationsstellung und nach sorgfältiger Nutzen- Risiko-Abwägung durch einen Arzt erfolgen.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen
Siccaforte- Augengel kann vorübergehend zu verschwommenen Sehen führen und somit das Reaktionsvermögen im Straßenverkehr oder beim Bedienen von Maschinen beeinträchtigen. Diese Tätigkeiten sollen erst bei vollständiger Wiederherstellung der Sehleistung wieder aufgenommen werden.

3. WIE IST SICCAFORTE - AUGENGEL ANZUWENDEN?
Zum Eintropfen in den Bindehautsack.
Wenden Sie Siccaforte - Augengel immer genau nach Anweisung gemäß dieser Gebrauchsinformation an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die Dosierung einzuhalten.

Dosierung:
Erwachsene:
2 bis 4 mal täglich und vor dem Schlafengehen 1 bis 2 Tropfen Gel in den Bindehautsack eintropfen. Die Tube beim Eintropfen senkrecht nach unten halten

Bei zusätzlicher Behandlung mit anderen Augentropfen soll zwischen der Anwendung der unterschiedlichen Medikamente mindestens ein Zeitraum von 5 – 10 Minuten, bei zusätzlicher Behandlung mit einer Augensalbe ein Zeitraum von 15 Minuten liegen.
Siccaforte - Augengel kann die Verweildauer anderer Augentropfen am Auge verlängern und damit deren Wirkung verstärken. Um dies zu vermeiden sollte Siccaforte - Augengel stets als Letztes angewendet werden.

Kinder und Jugendliche:
Die Unbedenklichkeit und Wirksamkeit von Siccaforte – Augengel wurde bei Kindern und Jugendlichen nicht nachgewiesen.

Art der Anwendung:
Zur Anwendung am Auge (zum Eintropfen in den Bindehautsack).
- Waschen Sie Ihre Hände vor der Anwendung sorgfältig.
- Vermeiden Sie einen Kontakt zwischen der Flaschenspitze und dem Auge oder dem Augenlid.
- Bringen Sie 1 – 2 Tropfen in jedes Auge ein. Sehen Sie dabei nach oben und ziehen Sie das untere Augenlid leicht nach unten. Die Tube beim Eintropfen senkrecht nach unten halten
- Auge einige Sekunden schließen ohne zuviel zusammenzupressen und dann mehrere Lidschläge machen
- Verschließen Sie die Flasche nach dem Gebrauch.



Dauer der Anwendung:
Bei der Behandlung des trockenen Auges, die in der Regel als Langzeit- und Dauertherapie erfolgt, sollte ein Augenarzt konsultiert werden (siehe auch Abschnitt 4 „Welche Nebenwirkungen sind möglich“).

Wenn Sie eine größere Menge von Siccaforte – Augengel angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie zuviel Siccaforte - Augengel angewendet haben, spülen Sie es mit lauwarmem Wasser aus dem Auge. Tropfen Sie nicht mehr nach, bis es Zeit ist für die nächste planmäßige Anwendung.

Wenn Sie die Anwendung von Siccaforte – Augengel vergessen haben

Wenn Sie eine Anwendung von Siccaforte - Augengel vergessen haben, machen Sie sich keine Sorgen, holen Sie die Anwendung sobald Sie daran denken nach. Tropfen Sie nicht die doppelte Dosis ein, um die versäumte Dosis nachzuholen.

Wenn Sie die Anwendung von Siccaforte - Augengel abbrechen
Brechen Sie die Einnahme nicht von sich aus ab, sondern fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Siccaforte - Augengel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

sehr häufig	*mehr als 1 Behandelter von 10*
häufig	*1 bis 10 Behandelte von 100*
gelegentlich	*1 bis 10 Behandelte von 1.000*
selten	*1 bis 10 Behandelte von 10.000*
sehr selten	*weniger als 1 Behandelter von 10.000*
nicht bekannt	*Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar*

Augenerkrankungen:
Gelegentlich: Unmittelbar nach dem Eintropfen kann es vorübergehend zu Verschwommensehen, Brennen in den Augen oder Verkleben der Lider kommen.

Allgemeine Erkrankungen:
Sehr selten: Unverträglichkeitsreaktionen gegen einen der Inhaltsstoffe.

Hinweis:
Siccaforte - Augengel enthält das Konservierungsmittel Cetrimid, das insbesondere bei häufigerer und längerer Anwendung Reizungen des Auges (Brennen, Rötungen, Fremdkörpergefühl) hervorrufen und das Hornhautepithel schädigen kann. Für die Langzeitbehandlung der chronischen Keratoconjunctivitis sicca sollten daher Präparate ohne Konservierungsmittel bevorzugt werden.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST SICCAFORTE - AUGENGEL AUFZUBEWAHREN?

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Außenkarton und Behältnis als „verwendbar bis“ bzw. „verw. bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Nach dem Öffnen der Tube darf Siccaforte - Augengel noch 6 Wochen verwendet werden.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Siccaforte - Augengel enthält:

Der Wirkstoff ist: Carbomer
1g Augengel enthält 2mg Carbomer

Die sonstigen Bestandteile sind: Cetrimid, Natriumhydroxid, Sorbitol (E 420), Wasser für Injektionszwecke.

Wie Siccaforte - Augengel aussieht und Inhalt der Packung

Klares, farbloses, tropffähiges Augengel.

1 Faltkarton enthält eine Tube mit 10 g.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer
Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165 – 173
13581 Berlin
E-Mail: kontakt@bausch.com

Hersteller
Anstalt zur gewerblichen Produktion von Heilmitteln und Arzneiwaren GmbH (AGEPHA),
A – 8561 Söding

Z.Nr.: 1-19006

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt 09.2015 genehmigt.