













**Einnahme von Lodotra zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Lodotra sollte zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken eingenommen werden. Die Einnahme von Lodotra sollte nicht auf nüchternen Magen erfolgen.

Lodotra sollte 2-3 mal täglich eingenommen werden. Die Einnahme sollte über den Tag verteilt sein.

**Schwangerschaft und Stillzeit**

Die Einnahme von Lodotra ist während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

**Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Die Einnahme von Lodotra kann zu Schläfrigkeit führen. Es ist von der Einnahme abzuraten, bis sich keine Schläfrigkeit mehr bemerkbar macht.

**Lodotra enthält Lactose**

Lodotra enthält Lactose. Patienten mit Lactoseintoleranz sollten vorsichtig sein.

**3. Wie ist Lodotra einzunehmen?**

Lodotra sollte wie folgt eingenommen werden:

Die Einnahme von Lodotra sollte über den Tag verteilt sein.

Die Einnahme von Lodotra sollte wie folgt sein:

- 2-3 mal täglich
- über den Tag verteilt

Die Einnahme von Lodotra sollte über den Tag verteilt sein.

Die Einnahme von Lodotra sollte über den Tag verteilt sein.

Die Einnahme von Lodotra sollte über den Tag verteilt sein.

Die Einnahme von Lodotra sollte über den Tag verteilt sein.

**Art der Anwendung**











