

## Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Aspirin® Express 1000 mg überzogene Tablette

Wirkstoff: Acetylsalicylsäure

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 Tagen (gilt für Fieber) bzw. 3–4 Tagen (gilt für Schmerzen) nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist *Aspirin Express 1000 mg* und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von *Aspirin Express 1000 mg* beachten?
3. Wie ist *Aspirin Express 1000 mg* einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist *Aspirin Express 1000 mg* aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### 1. Was ist *Aspirin Express 1000 mg* und wofür wird es angewendet?

*Aspirin Express 1000 mg* enthält Acetylsalicylsäure (Aspirin). Acetylsalicylsäure ist ein schmerzlinderndes und fiebersenkendes Arzneimittel. *Aspirin Express 1000 mg* bietet eine schnelle Schmerzlinderung durch die rasche Auflösung und eine schnelle Aufnahme der Acetylsalicylsäure.

*Aspirin Express 1000 mg* wird zur symptomatischen Behandlung leichter bis mäßig starker Schmerzen wie z. B. Kopfschmerzen, grippale Beschwerden, Zahnschmerzen, Muskelschmerzen und/oder Fieber angewendet.

***Aspirin Express 1000 mg* ist für Erwachsene und Jugendliche zwischen 16 und 65 Jahren bestimmt.**

#### 2. Was sollten Sie vor der Einnahme von *Aspirin Express 1000 mg* beachten?

***Aspirin Express 1000 mg* darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch gegen
  - o Acetylsalicylsäure,
  - o Salicylate: eine Medikamentengruppe zur Behandlung von Schmerzen oder Fieber, wozu auch Acetylsalicylsäure zählt, oder
  - o einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- wenn Sie an Asthma leiden oder in der Vergangenheit auf Acetylsalicylsäure oder ein ähnliches Arzneimittel (insbesondere nichtsteroidale Entzündungshemmer) allergisch reagiert haben (z. B. mit Nesselsucht, Schwellungen im Gesicht, starken schnupfenartigen Beschwerden, Schock).
- wenn Sie ein Magen- oder Darmgeschwür haben.
- wenn Sie häufig Blutungen haben oder Ihr Blutungsrisiko erhöht ist.
- wenn Sie eine stark eingeschränkte Nieren- oder Leberfunktion haben.

- wenn Sie eine stark eingeschränkte unkontrollierte Herzfunktion haben.
- wenn Sie mit Methotrexat in einer Dosierung von mehr als 20 mg/Woche behandelt werden. Siehe Abschnitt 2, **“Einnahme von Aspirin Express 1000 mg zusammen mit anderen Arzneimitteln”**, erster Aufzählungspunkt.
- wenn Sie mit Gerinnungshemmern zum Einnehmen (oralen Antikoagulanzen, Arzneimitteln, die das Blut verdünnen und die Gerinnung verhindern) behandelt werden.
- wenn Sie im letzten Trimester der Schwangerschaft sind.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie *Aspirin Express 1000 mg* einnehmen,

- wenn Sie mit anderen Produkten behandelt werden, die Acetylsalicylsäure enthalten, um eine Überdosierung zu vermeiden.
- wenn Kopfschmerzen während der Einnahme von *Aspirin Express 1000 mg* auftreten. Erhöhen Sie nicht die Dosis, sondern lassen Sie sich von Ihrem Arzt oder Apotheker beraten, wenn Kopfschmerzen auftreten während Sie hohe Dosen von Schmerzmitteln über einen längeren Zeitraum einnehmen.
- wenn Sie regelmäßig Schmerzmittel anwenden, insbesondere wenn Sie gleichzeitig mehrere Schmerzmittel kombinieren; dies kann zu einer Beeinträchtigung der Nierenfunktion führen.
- wenn Sie an Glucose-6-phosphat-dehydrogenase-Mangel leiden: eine erbliche Krankheit, von der die roten Blutkörperchen betroffen sind.
- wenn Sie schon einmal ein Magen- oder Darmgeschwür, eine Magen- oder Darmblutung oder eine Magenschleimhautentzündung (Gastritis) gehabt haben. Nehmen Sie *Aspirin Express 1000 mg* nicht ein, wenn Sie an Magen- oder Darmgeschwüren oder Blutungen leiden. Magen- oder Darmblutungen oder Geschwüre / Durchbrüche können jederzeit während der Behandlung auftreten. Das Risiko ist bei älteren Patienten, Patienten mit niedrigem Körpergewicht und Patienten, die Arzneimittel zur Hemmung der Blutgerinnung einnehmen, erhöht.
- wenn Ihre Nieren- oder Leberfunktion eingeschränkt ist. Nehmen Sie *Aspirin Express 1000 mg* nicht ein, wenn Sie eine stark eingeschränkte Nieren- oder Leberfunktion haben. Die regelmäßige Anwendung von Schmerzmitteln, speziell eine Kombination von Schmerzmitteln, kann zu einer anhaltenden Nierenschädigung mit dem Risiko einer eingeschränkten Nierenfunktion führen.
- wenn Sie Asthma haben. Nehmen Sie *Aspirin Express 1000 mg* nicht ein, wenn Ihr Asthma durch die Verwendung von Acetylsalicylsäure oder Arzneimitteln mit ähnlicher Wirkung verursacht wird.
- wenn Sie ungewöhnlich starke und längere Monatsblutungen oder Blutungen der Gebärmutter in unregelmäßigen Abständen haben. Es besteht das Risiko einer Erhöhung der Menge und Dauer der Periode.
- wenn ein operativer Eingriff geplant ist. Acetylsalicylsäure erhöht schon in geringen Dosen das Risiko von Blutungen. Dies gilt auch, wenn die Einnahme bereits mehrere Tage zurückliegt. Informieren Sie Ihren Arzt oder Ihren Zahnarzt, wenn ein operativer Eingriff geplant ist; dies gilt auch für kleinere Operationen.
- wenn während der Behandlung Blutungen im Magen-Darm-Trakt auftreten (Bluterbrechen, Blut im Stuhl, Schwarzfärbung des Stuhls); in diesem Fall müssen Sie die Behandlung beenden und sofort Ihren Arzt oder einen ärztlichen Notdienst anrufen.
- wenn Sie Gicht haben. Acetylsalicylsäure reduziert die Ausscheidung von Harnsäure.
- Die Anwendung dieses Arzneimittels während der Stillzeit wird nicht empfohlen.

### **Kinder und Jugendliche**

*Aspirin Express 1000 mg* ist für die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren nicht vorgesehen.

Genereller Hinweis:

- Das Reye-Syndrom ist eine seltene, schwerwiegende Erkrankung in Verbindung mit Nerven- und Leberschädigungen. Es wurde bei Kindern mit viralen Erkrankungen (insbesondere bei Grippe oder Windpocken) und unter der Behandlung mit Acetylsalicylsäure beobachtet. Deshalb darf Acetylsalicylsäure bei Kindern mit einer Viruserkrankung nur nach vorheriger Rücksprache mit einem Arzt angewendet werden;
- müssen Sie sofort die Behandlung abbrechen und Ihren Arzt informieren, wenn Schwindel oder Ohnmacht, abnormales Verhalten oder Erbrechen auftreten.

### **Einnahme von *Aspirin Express 1000 mg* zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bei Einnahme/Anwendung von

- Methotrexat: Ein Arzneimittel zur Behandlung von z.B. schwerer Gelenkentzündung, der Hautkrankheit Psoriasis oder Krebs.  
Nehmen Sie *Aspirin Express 1000 mg* nicht ein, wenn Sie mit Methotrexat in einer Dosierung von mehr als 20 mg pro Woche behandelt werden. Medizinische Überwachung wird empfohlen, wenn Sie Methotrexat in Dosen von 20 mg oder weniger pro Woche einnehmen.
- Arzneimittel zur Hemmung der Blutgerinnung oder zur Auflösung von Blutgerinnseln (z.B. orale Antikoagulantien, Heparin, Thrombolytika, Clopidogrel, Ticlopidin, Anagrelid).  
Nehmen Sie *Aspirin Express 1000 mg* nicht ein, wenn Sie mit Gerinnungshemmern zum Einnehmen (oralen Antikoagulantien) behandelt werden oder schon einmal ein Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwür hatten.
- Arzneimittel zur Behandlung von Schmerzen, Entzündungen oder Rheumatismus, welche zur Gruppe der sogenannten nichtsteroidalen Entzündungshemmer gehören:  
Prüfen Sie, dass andere verwendete Arzneimittel keine Acetylsalicylsäure enthalten.
- Glucocorticoide oral eingenommen oder als Injektion oder Infusion – ausgenommen eine Ersatztherapie mit Hydrocortison:  
Glucocorticoide sind Arzneimittel um eine Abstoßung bei Organtransplantationen zu verhindern oder um Entzündungen, wie Entzündungen der Haut im Fall von Asthma, zu reduzieren.
- Arzneimittel wie Citalopram, Escitalopram, Fluoxetin, Fluvoxamin, Paroxetin, Sertralin, (sogenannte SSRIs) zur Behandlung von Depressionen und andere Beschwerden.
- Arzneimittel zur Behandlung von hohem Blutdruck oder Erkrankungen, welche mit Wirkstoffen deren Namen auf “pril” oder “sartan” enden, behandelt werden und Arzneimittel zur Erhöhung der Wasserausscheidung durch Ihre Nieren:  
Das ausreichende Trinken von Flüssigkeit und die Überwachung der Nierenfunktion zu Beginn der Behandlung ist empfohlen.
- Arzneimittel gegen Gicht, z.B. Benzbromaron, Probenecid
- Pemetrexed: ein Arzneimittel zur Behandlung von Krebs
- Deferasirox: ein Arzneimittel zur Reduzierung des Bluteisenlevels
- Arzneimittel zur lokalen Behandlung von Magen-Darm-Beschwerden, Antazida und Aktivkohle

### **Einnahme von *Aspirin Express 1000 mg* zusammen mit Alkohol**

*Aspirin Express 1000 mg* darf nicht zusammen mit Alkohol eingenommen werden.

### **Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein, oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### **Schwangerschaft**

Während der letzten 3 Monate der Schwangerschaft dürfen Sie dieses Arzneimittel nicht mehr einnehmen, da dies Ihrem Kind schaden kann.

In den ersten sechs Monaten einer Schwangerschaft dürfen Sie *Aspirin Express 1000 mg* nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt einnehmen. In diesem Fall sollte die Dosierung so niedrig wie möglich und die Dauer der Behandlung so kurz wie möglich sein.

### **Stillzeit**

Acetylsalicylsäure geht in die Muttermilch über. Acetylsalicylsäure wird daher während der Stillzeit nicht empfohlen.

### **Fortpflanzungsfähigkeit**

Dieses Produkt gehört zu einer Gruppe von Arzneimitteln(NSARs), die die Fähigkeit von Frauen, schwanger zu werden, beeinträchtigen können. Diese Wirkung verschwindet nach dem Absetzen des Arzneimittels wieder.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Acetylsalicylsäure hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

### ***Aspirin Express 1000 mg* enthält Natrium**

Dieses Arzneimittel enthält 6 mmol (oder 143 mg) Natrium pro Dosis. Dies sollte bei einer kontrollierten Natriumdiät berücksichtigt werden.

## **3. Wie ist *Aspirin Express 1000 mg* einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

### **Dosierung**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Anweisung ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

### **Erwachsene und Jugendliche im Alter von 16-65 Jahren**

- Einzeldosis: 1 Tablette (1000 mg Acetylsalicylsäure)  
Die Einzeldosis kann bei Bedarf im Abstand von mindestens 4-6 Stunden wiederholt werden.
- Gesamttagesdosis: 1 Tablette 3 x täglich

*Patienten mit reduzierter Leber- und Nierenfunktion:*

Bitte beachten Sie die Anweisungen in Abschnitt 2, unter "*Aspirin Express 1000 mg darf nicht eingenommen werden*" and "**Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**".

### **Ältere Patienten (ab 65 Jahren und älter)**

Dieses Produkt ist nicht für die Anwendung bei Erwachsenen über 65 Jahren vorgesehen. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker über andere Formen und Stärken von acetylsalicylsäurehaltigen Produkten.

### **Kinder und Jugendliche**

Dieses Produkt ist nicht für die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren vorgesehen.

### **Art der Anwendung**

Um die Folie zu öffnen, reißen Sie die Kante an einer beliebigen Position ein.

Nehmen Sie die Tablette mit einem Glas Wasser ein. Die Teilerbe dient nur dazu, um Ihnen zu helfen die Tablette zu brechen, wenn Sie Schwierigkeiten haben sie im Ganzen zu schlucken.

#### **Dauer der Anwendung**

Wenden Sie dieses Arzneimittel maximal 3 Tage (bei Fieber) bzw. 3 – 4 Tage (gegen Schmerzen) an, es sei denn auf ausdrückliche ärztliche Anordnung.

#### **Wenn Sie eine größere Menge *Aspirin Express 1000 mg* eingenommen haben, als Sie sollten**

Es ist möglich, dass während der Behandlung Beschwerden wie Ohrensausen, Hörstörungen, Kopfschmerzen oder Schwindel auftreten; dies sind typische Zeichen einer Überdosierung.

Bei Verdacht auf Überdosierung beenden Sie die Einnahme und wenden Sie sich sofort an einen Arzt.

#### **Wenn Sie die Einnahme von *Aspirin Express 1000 mg* vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, um eine versäumte Dosis auszugleichen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Häufigkeiten: Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

#### **Mögliche Nebenwirkungen von Acetylsalicylsäure:**

Alle diese Nebenwirkungen sind sehr schwerwiegend und können dringende ärztliche Hilfe oder eine sofortige Aufnahme ins Krankenhaus erforderlich machen. Informieren Sie sofort Ihren Arzt oder begeben Sie sich in das nächstgelegene Krankenhaus, wenn Sie folgende Beschwerden bemerken:

- Blutungen, wie z.B.:
  - o Nasenbluten, Zahnfleischbluten
  - o rote Flecken unter der Haut, Blutergüsse
  - o Blutungen der Harn- und Geschlechtsorgane

Das Blutungsrisiko kann nach dem Absetzen von *Aspirin Express 1000 mg* noch 4 bis 8 Tage weiter bestehen. Infolgedessen kann das Blutungsrisiko bei Operationen erhöht sein. Auch Blutungen im Schädel, Magen oder Darm können vorkommen.

- Überempfindlichkeitsreaktionen, schwere allergische Reaktionen welche ein Anschwellen des Gesichts oder Halses oder Asthma verursachen
- Kopfschmerzen, Schwindel, Hörstörungen, Ohrensausen (Tinnitus); derartige Beschwerden sind gewöhnlich Zeichen einer Überdosierung
- Hirnblutung
- Magenschmerzen
- Magen-Darm-Blutung  
Symptome sind Bluterbrechen und schwarzer Stuhl. Das Blutungsrisiko ist dosisabhängig.
- Magengeschwür und Durchbruch
- Anstieg der Leberenzyme, die sich nach dem Absetzen der Behandlung weitgehend normalisieren, Leberfunktionsstörung (betroffen sind hauptsächlich die Leberzellen).
- Nesselsucht (Urtikaria), Hautreaktionen
- Reye-Syndrom (siehe Abschnitt 2.)

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem (Details siehe unten) anzeigen.

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen  
Traisengasse 5  
1200 Wien  
ÖSTERREICH  
Fax: + 43 (0) 50 555 36207  
Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### **5. Wie ist *Aspirin Express 1000 mg* aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nicht über 30°C lagern.

In der Originalfolie aufbewahren um die Tabletten vor Feuchtigkeit zu schützen.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

#### **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

##### **Was *Aspirin Express 1000 mg* enthält**

- Der Wirkstoff ist: Acetylsalicylsäure.
- Eine überzogene Tablette enthält 1000 mg Acetylsalicylsäure.

Die sonstigen Bestandteile sind:

- Tablettenkern: kolloidales Siliciumdioxid, Natriumcarbonat, wasserfrei
- Überzug: Carnaubawachs, Hypromellose, Zinkstearat

##### **Wie *Aspirin Express 1000 mg* aussieht und Inhalt der Packung**

Weiß bis gebrochen weiß überzogene Tablette mit der Prägung „BAYER“ auf der einen Seite und einer einzelnen Teilerbe auf der anderen Seite.

Die Teilerbe dient nur zum Teilen, um das Schlucken zu erleichtern, und nicht zum Teilen in gleiche Dosen.

*Aspirin Express 1000 mg* ist in Packungen mit kindersicheren Streifen zu 4, 8, 12 oder 24 Tabletten erhältlich

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

#### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

##### **Pharmazeutischer Unternehmer:**

Bayer Austria Ges.m.b.H.

Herbststraße 6 – 10  
A-1160 Wien

**Hersteller:**

Bayer Bitterfeld GmbH  
Salegaster Chaussee 1  
06803 Bitterfeld-Wolfen  
Deutschland

Z.Nr.:

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im März 2016.**