

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

WICK Benzydamin 3 mg Lutschtabletten mit Zitronengeschmack

Wirkstoff: Benzydaminhydrochlorid

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist WICK Benzydamin 3 mg Lutschtabletten mit Zitronengeschmack und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von WICK Benzydamin 3 mg Lutschtabletten mit Zitronengeschmack beachten?
3. Wie ist WICK Benzydamin 3 mg Lutschtabletten mit Zitronengeschmack einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist WICK Benzydamin 3 mg Lutschtabletten mit Zitronengeschmack aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist WICK Benzydamin 3 mg Lutschtabletten mit Zitronengeschmack und wofür wird es angewendet?

WICK Benzydamin 3 mg Lutschtabletten mit Zitronengeschmack enthalten den Wirkstoff Benzydaminhydrochlorid. Der Wirkstoff ist der Bestandteil der Lutschtabletten, der die therapeutische Wirkung hat, die Sie benötigen.

WICK Benzydamin 3 mg Lutschtabletten mit Zitronengeschmack werden zur Behandlung akuter Halsschmerzen bei Erwachsenen und Kindern über 6 Jahren angewendet.

Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von WICK Benzydamin 3 mg Lutschtabletten mit Zitronengeschmack beachten?

WICK Benzydamin 3 mg Lutschtabletten mit Zitronengeschmack dürfen nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen Benzydaminhydrochlorid oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie WICK Benzydamin 3 mg Lutschtabletten mit Zitronengeschmack einnehmen,

- wenn Sie an einer Krankheit leiden, die Phenylketonurie genannt wird.
- wenn Sie an Asthma leiden oder in der Vergangenheit gelitten haben.
- wenn Sie allergisch gegen Salicylate (z.B. Acetylsalicylsäure und Salicylsäure) oder andere entzündungshemmende Schmerzmittel, sogenannte NSAR, sind.

- wenn die Schmerzen in Ihrem Hals nach der Anwendung der Lutschtabletten zunehmen oder innerhalb von 3 Tagen keine Besserung eintritt oder wenn Sie fiebrig sind oder starke Schmerzen im Hals oder andere Beschwerden haben, müssen Sie mit Ihrem Arzt sprechen.

Kinder

Aufgrund der Darreichungsform dürfen WICK Benzydamin 3 mg Lutschtabletten mit Zitronengeschmack Kindern unter 6 Jahren nicht gegeben werden.

Einnahme von WICK Benzydamin 3 mg Lutschtabletten mit Zitronengeschmack zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden, einschließlich Arzneimittel, die Sie ohne Verschreibung erhalten haben.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

WICK Benzydamin 3 mg Lutschtabletten mit Zitronengeschmack sind während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht anzuwenden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es ist nicht bekannt, dass WICK Benzydamin 3 mg Lutschtabletten mit Zitronengeschmack Ihre Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen beeinflusst.

Einnahme von WICK Benzydamin 3 mg Lutschtabletten mit Zitronengeschmack zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Nahrungsmittel und Getränke haben keinen Einfluss.

WICK Benzydamin 3 mg Lutschtabletten mit Zitronengeschmack enthalten Isomalt und Aspartam

Bitte nehmen Sie WICK Benzydamin 3 mg Lutschtabletten mit Zitronengeschmack erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden. Das Arzneimittel enthält Aspartam als Quelle für Phenylalanin und kann schädlich sein, wenn Sie eine Phenylketonurie haben.

3. Wie ist WICK Benzydamin 3 mg Lutschtabletten mit Zitronengeschmack einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren: 1 Lutschtablette sollte 3x täglich gelutscht werden, wenn Sie Schmerzlinderung benötigen. Sie dürfen nicht mehr als 3 Lutschtabletten pro Tag nehmen.

Sie dürfen WICK Benzydamin 3 mg Lutschtabletten mit Zitronengeschmack nicht länger als 7 Tage anwenden.

Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen oder wenn Sie Fieber oder starke Schmerzen im Hals oder andere Beschwerden haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Kinder zwischen 6 bis 11 Jahren: Das Arzneimittel ist nur unter Aufsicht eines Erwachsenen anzuwenden.

Anwendung im Mund und Rachen:

1 Lutschtablette langsam im Mund zergehen lassen.

Nicht schlucken.
Nicht kauen.

Wenn Sie eine größere Menge von WICK Benzydamin 3 mg Lutschtabletten mit Zitronengeschmack eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie versehentlich zu viele Lutschtabletten eingenommen haben, suchen Sie sofort Ihren Apotheker, Arzt oder die Notfallabteilung des nächstgelegenen Krankenhauses auf. Nehmen Sie immer das verpackte Arzneimittel mit, egal, ob noch Lutschtabletten enthalten sind oder nicht.

In sehr seltenen Fällen sind bei Kindern nach der oralen Anwendung von Benzydamin in Dosen, die zirka 100mal höher als die der Lutschtablette waren, Erregung, Krämpfe, Schweißausbrüche, unkontrollierte Bewegungen, Zittern und Erbrechen aufgetreten.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel können auch WICK Benzydamin 3 mg Lutschtabletten mit Zitronengeschmack Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nebenwirkungen können auftreten:

Sehr häufig:	kann mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen
Häufig:	kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen
Gelegentlich:	kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen
Selten:	kann bis zu 1 von 1.000 Behandelten betreffen
Sehr selten:	kann bis zu 1 von 10.000 Behandelten betreffen
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

Gelegentlich

- Hautempfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht (bewirkt einen Ausschlag oder Sonnenbrand)

Selten

- Mundbrennen oder Mundtrockenheit. Wenn das auftritt, versuchen Sie, in kleinen Schlucken Wasser zu trinken, um diesen Effekt zu reduzieren.

Sehr selten

- Plötzliche Schwellung im Mund/Hals und der Schleimhäute (Angioödem (Beschwerden können sein: Schwierigkeiten beim Atmen oder Schlucken, Hautausschlag, Juckreiz, Nesselausschlag oder Schwellung von Gesicht, Händen und Füßen, Augen, Lippen und/oder Zunge, Benommenheit)).
- Schwierigkeiten beim Atmen (Laryngospasmus oder Bronchospasmus).

Nicht bekannt

- Allergische Reaktionen (Überempfindlichkeit)
- Anzeichen einer schweren allergischen Reaktion (anaphylaktischer Schock), können umfassen Atemnot (Schwierigkeit beim Atmen), Brustschmerz, Brustenge, Schwindel, Schwächegefühl, starker Juckreiz der Haut, tastbare Knoten auf der Haut, Schwellung des Gesichtes, der Lippen, der Zunge und/oder der Kehle und potenziell lebensbedrohlich sein.
- Lokales Taubheitsgefühl der Mundschleimhaut (orale Hypoästhesie)

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5
AT-1200 WIEN
Fax: + 43 (0) 50 555 36207
Website: <http://www.basg.gv.at/>

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist WICK Benzydamin 3 mg Lutschtabletten mit Zitronengeschmack aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Blisterfolie nach „Verwendbar bis:“ bzw. „Verw. bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was WICK Benzydamin 3 mg Lutschtabletten mit Zitronengeschmack enthält

Der Wirkstoff ist: Benzydaminhydrochlorid.

Eine Lutschtablette enthält 3 mg Benzydaminhydrochlorid (entsprechend 2,68 mg Benzydamin).

Die sonstigen Bestandteile sind:

Isomalt (E-953)
Citronensäure-Monohydrat
Aspartam (E-951)
Chinolingelb (E-104)
Zitronengeschmack
Pfefferminzöl

Wie WICK Benzydamin 3 mg Lutschtabletten mit Zitronengeschmack aussieht und Inhalt der Packung

WICK Benzydamin 3 mg Lutschtabletten mit Zitronengeschmack liegen als runde, gelbe Lutschtabletten, 19 mm im Durchmesser, mit Zitronengeschmack vor.

Die Lutschtabletten sind in PVC-PVDC/Aluminium-Blisterpackungen verpackt.

Packungsgrößen: 8, 12, 16, 20, 24 Lutschtabletten.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer

TEVA B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem

Niederlande
Tel.Nr.: +43/1/97007-0
Fax-Nr.: +43/1/97007-66
e-mail: info@ratiopharm.at

Hersteller

LOZY'S PHARMACEUTICALS S.L.
Campus Empresarial
Lekaroz
31795 Navarra
Spanien

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:

Spanien: BENCIDAMINA TEVA 3 MG PASTILLAS PARA CHUPAR SABOR LIMON

Z.Nr.: 137240

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im August 2017.