

**Gebrauchsinformation: Information für Anwender  
neo-angin – Spray zur Anwendung in der Mundhöhle**

2,4-Dichlorbenzylalkohol, Amylmetacresol, Levomenthol

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.  
Siehe Abschnitt 4.

**Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist neo-angin – Spray und wofür wird es angewendet ?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von neo-angin - Spray beachten ?
3. Wie ist neo-angin – Spray anzuwenden ?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich ?
5. Wie ist neo-angin – Spray aufzubewahren ?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

**1. Was ist neo-angin-Spray und wofür wird es angewendet?**

Bei neo-angin – Spray handelt es sich um ein antiseptisch wirkendes Arzneimittel für Mund und Rachen.

neo-angin – Spray ist ein Spray zur Anwendung in der Mundhöhle bei Halsschmerzen, Rachenkatarrh, Heiserkeit, Erkältungen, Angina, Entzündungen des Mund- und Rachenraumes (Pharyngitis) sowie des Zahnfleisches bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab zwei Jahren.

**2. Was sollten Sie vor der Anwendung von neo-angin – Spray beachten?**

**neo-angin Spray darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie allergisch gegen 2,4-Dichlorbenzylalkohol, Amylmetacresol, Levomenthol oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- bei Patienten mit Bronchialasthma oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen. Die Inhalation von neo-angin – Spray kann zu Atemnot führen oder einen Asthmaanfall auslösen.
- bei Säuglingen und Kleinkindern bis zu 2 Jahren (Gefahr eines Kehlkopfkrampfes).

**Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie neo-angin – Spray anwenden.

**Kinder**

Wenden Sie neo-angin – Spray nicht bei Kindern unter zwei Jahren an. Die Anwendung bei Kindern muss unter der Aufsicht Erwachsener erfolgen.

### **Anwendung von neo-angin – Spray mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Wechselwirkungen sind nicht bekannt.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Die Anwendung von neo-angin – Spray wird in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

Es liegen keine hinreichenden Daten für die Verwendung von neo-angin Spray bei Schwangeren vor. Aufgrund fehlender Erfahrung können Risiken für das ungeborene Kind nicht ausgeschlossen werden.

Es ist nicht bekannt, ob die Wirkstoffe in die Muttermilch übergehen.

neo-angin – Spray **enthält Ethanol, Propylenglykol und Butylhydroxyanisol (E 320)**

neo-angin – Spray enthält geringe Mengen an Ethanol (Alkohol), weniger als 100 mg pro Dosis.

Propylenglykol kann Hautreizungen hervorrufen.

Dieses Arzneimittel enthält Butylhydroxyanisol (E 320), das örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis), Reizungen der Augen und der Schleimhäute hervorrufen kann.

### **3. Wie ist neo-angin – Spray anzuwenden?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Soweit nicht anders verordnet, können Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 2 Jahren eine Einzeldosis (das entspricht 2 Sprühstößen) bis zu 6-mal am Tag anwenden.

Zur Anwendung in der Mundhöhle.

Zur Anwendung die Verschlusskappe abnehmen und den Zerstäuberknopf drücken. Beim Zerstäuben muss der Sprühkopf so weit wie möglich in den Mund und Rachenraum geführt werden und auf den schmerzenden Bereich gerichtet sein.

Wenn Sie sich nach 3-4 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von neo-angin – Spray angewendet haben, als Sie sollten**

Bislang ist kein Fall einer Überdosierung bekannt.

Im unwahrscheinlichen Fall einer Überdosierung könnten die beschriebenen Nebenwirkungen verstärkt auftreten. In diesem Fall wird eine symptomatische Behandlung empfohlen.

#### **Wenn Sie die Anwendung von neo-angin – Spray vergessen haben**

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben. Setzen Sie die Anwendung wie gewohnt fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Wenn Sie eine der folgenden Nebenwirkungen an sich bemerken, stoppen Sie sofort die Anwendung von neo-angin – Spray und wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt.

Sehr selten (kann bis zu 1 von 10.000 Behandelten betreffen): Reizung der Mund- und Magenschleimhaut, wie zum Beispiel Verdauungsstörungen (Dyspepsie), Übelkeit.

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar): Allergische Reaktionen wie zum Beispiel Schwellungen an Mund, Zunge und Lippen, Ausschlag.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### **5. Wie ist neo-angin-Spray aufzubewahren?**

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerbedingungen erforderlich.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Die Haltbarkeit nach Anbruch beträgt 6 Monate.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

#### **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was neo-angin – Spray enthält**

- Die Wirkstoffe sind: 2,4-Dichlorbenzylalkohol, Amylmetacresol und Levomenthol

1 ml Lösung enthält:

14,58 mg 2,4-Dichlorbenzylalkohol  
2,92 mg Amylmetacresol  
0,87 mg Levomenthol

1 Dosisereinheit (2 Sprühstöße = 0,18 ml) enthält:

2,4-Dichlorbenzylalkohol	2,624 mg
Amylmetacresol	0,525 mg
Levomenthol	0,156 mg

- Die sonstigen Bestandteile sind:

Sternanisöl  
Pfefferminzöl  
Ethanol 96%  
Propylenglykol  
Kirsch-Aroma (enthält unter anderem Butylhydroxyanisol [E 320])  
Wintergrünöl  
Aroma zur Maskierung (enthält unter anderem Propylenglykol)

### **Wie neo-angin – Spray aussieht und Inhalt der Packung**

Klares, farbloses Spray zur Anwendung in der Mundhöhle (Lösung) mit charakteristischem Geruch.

Braunglasflasche mit 30 ml Lösung und Sprühpumpe.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

#### **Zulassungsinhaber**

M.C.M. Klosterfrau Healthcare GmbH  
Doerenkampgasse 11, A 1100 Wien  
Tel.: +43 (0) 1 688 21 61  
Fax: +43 1 688 21 61 27  
Email: office@klosterfrau.at

#### **Hersteller**

Divapharma GmbH  
Motzener Straße 41  
12277 Berlin  
Deutschland

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im September 2016.**