

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Ichthalgan® forte

Wirkstoffe: Heparin Natrium, Natriumbituminosulfonat (Ichthyol®-Natrium), hell

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Ichthalgan® forte - Creme und wofür wird sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Ichthalgan® forte beachten?
3. Wie ist Ichthalgan® forte anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Ichthalgan® forte aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Ichthalgan® forte - Creme und wofür wird sie angewendet?

Ichthalgan forte ist eine Creme mit einem Wirkstoff aus der Gruppe der sulfonierten Schieferöle. Sie wirkt entzündungshemmend, bakterienabwehrend, durchblutungssteigernd sowie schmerzlindernd. Heparin wirkt gerinnungshemmend.

Ichthalgan® forte wird angewendet zur unterstützenden Behandlung nach stumpfen Traumen (z. B. Prellung, Verstauchung), bei Schmerzen aufgrund von Überbeanspruchung und bei oberflächlicher Venenentzündung, sofern diese nicht durch Kompression behandelt werden kann.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Ichthalgan® forte beachten?

Ichthalgan® forte darf nicht angewendet werden,

wenn Sie überempfindlich gegen sulfonierte Schieferöle wie z. B. Ammoniumbituminosulfonat und/oder Natriumbituminosulfonat, Heparin oder einen der anderen sonstigen Bestandteile sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie Ichthalgan® forte anwenden.

Ichthalgan® forte darf nicht auf offene Wunden gebracht werden. Bei schmerzhaften Entzündungen und oberflächlichen Venenentzündungen darf die Creme nicht einmassiert, sondern nur mit Hilfe eines Salbenträgers (z. B. Leinenlappen) auf die betroffene Stelle aufgebracht werden.

Ein Kontakt mit den Augen ist zu vermeiden.

Bei einer akuten Venenentzündung oder einer anderen ernsten Erkrankung ist die Zuziehung eines Arztes erforderlich.

Bei Fortbestand der Beschwerden oder wenn der erwartete Erfolg durch die Anwendung nicht eintritt, ist ehestens eine ärztliche Beratung erforderlich.

Anwendung von Ichthalgan® forte zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel anzuwenden.

Der gleichzeitige, zusätzliche Gebrauch von gerinnungshemmenden Mitteln kann die Wirkung von Ichthalgan® forte verstärken.

Natriumbituminosulfonat, hell kann die Löslichkeit anderer Wirkstoffe erhöhen und somit deren Aufnahme in die Haut verstärken.

Schwangerschaft und Stillzeit

Es liegen keine hinreichenden Daten für die Anwendung von Ichthalgan® forte während der Schwangerschaft oder Stillzeit vor.

Über die Anwendung während der Schwangerschaft oder Stillzeit entscheidet ein Arzt.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Ichthalgan® forte hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

Ichthalgan® forte enthält Cetylstearylalkohol, Butylhydroxytoluol und Propylenglycol

Cetylstearylalkohol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

Butylhydroxytoluol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis), Reizungen der Augen und Schleimhaut hervorrufen.

Propylenglycol kann Hautreizungen verursachen.

3. Wie ist Ichthalgan® forte anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Art der Anwendung

Die Creme wird im Bereich der schmerzhaften Krankheitserscheinung leicht in die Haut eingerieben. Bei sparsamem Gebrauch zieht die Creme rasch in die Haut ein, so dass die

Wäsche nicht verschmutzt wird und kein Verband nötig ist. Die beim Einreiben anfangs zu beobachtende weißliche Verfärbung beruht auf Lufteinschlüssen („Schaumbildung“) und lässt bei weiterem leichtem Einreiben schnell nach.

Dosierung bei Erwachsenen

Falls nicht anders verordnet, Dosierung genau einhalten.

2 – 3mal täglich eine entsprechende Menge Creme dünn auf die erkrankte oder verletzte Stelle auftragen.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen

Es liegen keine Daten über eine Anwendung bei Kindern und Jugendlichen vor.

Wenn Sie eine größere Menge Ichthalgan® forte angewendet haben, als Sie sollten

Bei Hautreaktionen ist das Präparat abzusetzen. Gegebenenfalls wenden Sie sich bitte an einen Arzt, der - falls erforderlich - eine symptomatische Behandlung durchführen wird.

Wenn Sie die Anwendung von Ichthalgan® forte vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie die Anwendung von Ichthalgan® forte abbrechen

Besprechen Sie mit einem Arzt bitte die weitere Vorgehensweise, da der Behandlungserfolg gefährdet ist.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Patienten auftreten müssen.

Erkrankungen des Immunsystems

Sehr selten (weniger als 1 Behandler von 10.000): Kontaktallergie. Wenden Sie sich in solchen Fällen an einen Arzt.

Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes

In seltenen Fällen (1 bis 10 Behandelte von 10.000) kann es zu Unverträglichkeitsreaktionen der Haut kommen (Jucken, Brennen, stärkere Rötung).

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt beim Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, Traisengasse 5, AT-1200 Wien, Website: <http://www.basg.gv.at>, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Ichthalgan® forte aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton oder der Tube nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nicht über 25°C lagern.

Nach Anbruch ist das Arzneimittel 24 Monate verwendbar, jedoch nicht über das Verfalldatum hinaus.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Ichthalgan® forte enthält

Die Wirkstoffe sind Natriumbituminosulfonat (Ichthyol®-Natrium), hell und Heparin.

100g Creme enthalten: 30.000 I.E. Heparin Natrium und 4,0 g Natriumbituminosulfonat (Ichthyol®-Natrium), hell

Die sonstigen Bestandteile sind:

Phenoxyethanol, Oxyhex 2004, Parfumöl Camisan, Hartfett, mittelkettige Triglyceride, weißes Vaseline, Glycerolmonostearat 40-55, Sorbitanmonostearat, emulg. Cetylstearylalkohol (Typ A), Macrogolcetylstearylether, Propylenglycol, gereinigtes Wasser

Wie Ichthalgan® forte aussieht und Inhalt der Packung

Ichthalgan forte ist eine schwach gelblich-beige Creme.

Ichthalgan forte – Creme ist in Tuben mit 40 g Creme erhältlich (Aluminiumtuben mit Kunststoff-Schraubverschluss).

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

ICHTHYOL-GESELLSCHAFT

Cordes, Hermann & Co. (GmbH & Co.) KG

Sportallee 85

22335 Hamburg

Tel.: 040-50714-0

Fax: 040-50714-110

E-Mail: info@ichthyol.de

Wissenschaftliche Beratung und Distribution in Österreich:

Sanova Pharma GesmbH, Wien

Zulassungsnummer: 15.342

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2016.