

## **GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER**

**Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss der Schottenfelder Brusttee jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

### **WAS IST SCHOTTENFELDER BRUSTTEE UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?**

Schottenfelder Brusttee ist eine Teemischung mit schleimlösender, auswurfördernder und reizlindernder Wirkung bei Husten.

Er wird angewendet bei Anzeichen von Erkältungskrankheiten, insbesondere bei Katarrhen der Atemwege.

Die Anwendung bei Kindern unter 6 Jahren sollte nur nach Rücksprache mit einem Arzt erfolgen.

### **WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON SCHOTTENFELDER BRUSTTEE BEACHTEN?**

**Schottenfelder Brusttee darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile sind,
- während der Schwangerschaft und Stillzeit,
- bei entzündlichen Erkrankungen im Magen-Darmbereich und im Bereich der Gallenwege,
- bei schweren Lebererkrankungen
- bei schweren Nierenfunktionsstörungen,
- bei schweren Herz-/Kreislaufkrankungen,
- bei Diabetes (Zuckerkrankheit).

### **Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Schottenfelder Brusttee ist erforderlich**

Wenn Sie unter Asthma oder einer hormonabhängigen Erkrankung (z.B. einem östrogenabhängigen Tumor) leiden, sollten Sie den Schottenfelder Brusttee nur nach Rücksprache mit einem Arzt anwenden.

### **Bei Anwendung von Schottenfelder Brusttee mit anderen Arzneimitteln**

Es wird ein Abstand von mindestens einer Stunde zwischen der Anwendung von Schottenfelder Brusttee und der Einnahme anderer Medikamente empfohlen, da die Aufnahme bzw. Wirkung anderer, gleichzeitig eingenommener Arzneimittel abgeschwächt oder verstärkt werden kann.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Schottenfelder Brusttee darf während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

### **WIE IST SCHOTTENFELDER BRUSTTEE ANZUWENDEN?**

Zur Einnahme nach Bereitung eines Aufgusses.

Für eine Tasse wird 1 Teelöffel Tee mit siedendem Wasser (150 ml) übergossen, bedeckt etwa 10 Minuten stengelassen, und dann abgeseiht.

Mehrmals täglich 1 Tasse frisch zubereiteten Tee zwischen den Mahlzeiten trinken.

Zur Unterstützung der Wirkung ist auf eine zusätzliche ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu achten.

Die Teemischung sollte ohne Rücksprache mit dem Arzt nicht länger als 4-6 Wochen eingenommen werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung von Schottenfelder Brusttee haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### **WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

In Einzelfällen können allergische Reaktionen, Magenbeschwerden, Übelkeit, Durchfall und Erbrechen auftreten. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine weiteren Nebenwirkungen bekannt.

Bei Langzeitanwendung kann es zu einer vermehrten Wasseransammlung im Gewebe, zu Bluthochdruck, Muskelschwäche und Herzrhythmusstörungen kommen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt, oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

### **WIE IST DER SCHOTTENFELDER BRUSTTEE AUFZUBEWAHREN?**

Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

### **WEITERE INFORMATIONEN**

#### **Was Schottenfelder Brusttee enthält**

100 g enthalten: Thymianblätter 10 g, Spitzwegerichblätter 20 g, Eukalyptusblätter 10 g, Eibischblätter 10g, Eibischwurzel 10 g Süßholzwurzel 10 g, Schachtelhalmkraut 10 g, Lindenblüten 10 g, Holunderblüten 10g.

**Reg. Nr.: 5-00941**

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im November 2009.**