

B. PACKUNGSBEILAGE

GEBRAUCHSINFORMATION
Flubenol easy 220 mg – Kautabletten für Hunde

1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaber:
VETOCENTRE,
2 rue des Ribes
63170 Aubière
Frankreich

Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller:
Parapharm A/S, Lyngø, Dänemark

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS
Flubenol easy 220 mg – Kautabletten für Hunde

3. WIRKSTOFF UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Wirkstoff:

Flubendazol 220 mg

Sonstige Bestandteile

getrocknete Bierhefe, hochdisperses Siliziumdioxid, Hydroxypropylmethylcellulose, Natrium-laurylsulfat, Sorbit, Rindfleischgeschmack, mikrokristalline Zellulose, Magnesiumstearat

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Zur Behandlung von Wurminfektionen bei Hunden hervorgerufen durch:

Spulwürmern

Toxocara canis
Toxascaris leonina

Hakenwürmern

Uncinaria stenocephala
Ancylostoma caninum

Peitschenwürmern

Trichuris vulpis

Bandwürmern

Taenia pisiformis (ungleichmäßige Wirkung)

5. GEGENANZEIGEN

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile.

6. NEBENWIRKUNGEN

Vereinzelte vorübergehende Erbrechen und milder Durchfall beobachtet.

Falls Sie Nebenwirkungen bei Ihrem Tier feststellen, insbesondere solche die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

7. ZIELTIERART

Hund

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Zum Eingeben.

Dosierung

1 Kautablette pro 10 kg Körpergewicht = 22 mg/kg KGW

Die kreuzförmig markierten Kautabletten können in 4 Portionen geteilt werden; das ermöglicht eine Dosierung von $\frac{1}{4}$ Tablette für 2,5 kg Körpergewicht.

Dosierungs-Schema

Mit Spulwürmern und/oder Hakenwürmern infizierte Hunde:

1 Kautablette pro 10 kg KGW, 1x pro Tag an zwei aufeinanderfolgenden Tagen.

Beispiele:

Gewicht des Hundes	1. Tag (Kautabletten)	2. Tag (Kautabletten)
2,5 kg	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
5 kg	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
7,5 kg	$\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$	$\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$
10 kg	1	1
20 kg	2	2
30 kg	3	3
45 kg	4 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$
60 kg	6	6

1 Packung mit 6 Kautabletten reicht für die Behandlung von Hunden bis zu einem Körpergewicht von 30 kg.

Mit Peitschenwürmern und/oder Bandwürmern infizierte Hunde:

1 Kautablette pro 10 kg KGW, 1x pro Tag an drei aufeinanderfolgenden Tagen.

Beispiele:

Gewicht des Hundes	1. Tag (Kautabletten)	2. Tag (Kautabletten)	3. Tag (Kautabletten)
2,5 kg	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
5 kg	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
7,5 kg	$\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$	$\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$	$\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$
10 kg	1	1	1
20 kg	2	2	2
30 kg	3	3	3
45 kg	4 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$
60 kg	6	6	6

1 Packung mit 6 Kautabletten reicht für die Behandlung von Hunden bis zu einem Körpergewicht von 20 kg.

Allgemeines Behandlungsschema:

- Junge Hunde: - sobald die Tiere entwöhnt sind, dann alle 2 bis 3 Monate
- Hündinnen: - während der Läufigkeit
- 10 Tage vor und 10 Tage nach dem Werfen
- Erwachsene Tiere: - 3 bis 4mal jährlich
- Alle Hunde: - vor Impfungen

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Die Kautabletten können dem Hund als Leckerbissen angeboten werden. Manchmal kann es vorkommen, dass ein Hund die Kautabletten auf diese Art nicht akzeptiert. In diesen Fällen können die Kautabletten verabreicht werden, indem sie weit hinten auf die Zunge gelegt oder in eine kleine Portion Futter gemischt werden.

10. WARTEZEIT

Nicht zutreffend.

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Nicht über 30°C lagern
Im Originalbehältnis aufbewahren

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Karton angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren

Nach häufiger, wiederholter Anwendung von Wirkstoffen derselben Substanzklasse von Anthelmintika kann sich eine Resistenz gegen die gesamte Substanzklasse entwickeln.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender

Nur bei Tieren anwenden.

Nach Verabreichung Hände waschen.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Im Falle einer versehentlichen Einnahme der Tabletten, vor allem durch Kinder, ist ein Arzt zu Rate zu ziehen und die Packungsbeilage oder das Etikett vorzuzeigen.

Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode

Flubenol kann während der Trächtigkeit und Laktation angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen

Nicht mit anderen Arzneimitteln gleichzeitig verabreichen.

Überdosierung (Symptome, Notfallmaßnahmen, Gegenmittel), falls erforderlich

Bei Überdosierung sind keine Nebenwirkungen zu erwarten.

Inkompatibilitäten

Keine bekannt.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Abgelaufene oder nicht vollständig entleerte Packungen sind als gefährlicher Abfall zu behandeln und gemäß den geltenden Vorschriften einer unschädlichen Beseitigung zuzuführen. Leere Packungen sind mit dem Hausmüll zu entsorgen.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

November 21012

15. WEITERE ANGABEN

Packungsgröße: Faltschachtel mit 6 Kautabletten (2 Blister mit je 3 Kautabletten).

Rezept- und apothekenpflichtig.

Z. Nr.: 8-00423