Gebrauchsinformation: Information für den Anwender
EST-Tabletten
Aluminium-Kaliumsulfat, Kalziumazetat, gefälltes Kalziumkarbonat, Weinsäure

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.
Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen EST-Tabletten jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:
1. Was sind EST-Tabletten und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von EST-Tabletten beachten?
3. Wie sind EST-Tabletten anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind EST-Tabletten aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was sind EST-Tabletten und wofür werden sie angewendet?
EST-Tabletten, in Wasser gelöst, ergeben eine essigsaure-weinsaure Tonerdelösung zum äußerlichen Gebrauch in Form von Umschlägen. Die Wirkung dieses milden Hausmittels ist kühlend, zusammenziehend (adstringierend), entzündungshemmend, juckreizstillend und schweißhemmend.

Anwendungsgebiete:
Schwellungen, Verstauchungen, Quetschungen, Insektenstiche.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von EST-Tabletten beachten?
EST-Tabletten dürfen nicht angewendet werden
- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Metalle (insbesondere Aluminium) oder einen der sonstigen Bestandteile von EST – Tabletten sind;
- bei offenen Verletzungen
- bei Ekzemen

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von EST-Tabletten ist erforderlich
EST-Lösung von Augen und Schleimhaut fernhalten.
EST-Lösung ist nur für den äußerlichen Gebrauch bestimmt, EST Lösung darf nicht getrunken werden!

Bei Anwendung von EST-Tabletten mit anderen Arzneimitteln
Bisher sind keine Wechselwirkungen von EST-Tabletten mit anderen Arzneimitteln bekannt. Mit Alkalien, Bleisalzen, Phosphaten, Tannin dürfen EST – Tabletten nicht gemischt werden.

Schwangerschaft und Stillzeit
Eine Aufnahme der Wirkstoffe durch die unverletzte Haut ist nicht zu erwarten
Schwangerschaft
Bisher liegen beim Menschen keine Erkenntnisse über Risiken bei der Anwendung von EST-Tabletten während der Schwangerschaft vor.

Stillzeit
Der Übertritt der Wirkstoffe in die Muttermilch wurde bisher nicht untersucht. Nicht im Brustbereich anwenden!

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen
Keine Auswirkungen.

3. Wie sind EST-Tabletten anzuwenden?

Dosierung
1 Tablette in 1/2 Liter Wasser unter Rühren lösen (Tablette zuvor in mehrere Teile brechen). Sobald die Tablette fein verteilt ist, ist die Lösung gebrauchsfertig und darf weder abgeseiht noch gefiltert werden.

Die Behandlung soll über etwa 4-8 Stunden erfolgen.

Art der Anwendung
Ein ausreichend großes Tuch in der Lösung tränken und locker um die zu behandelnde Körperstelle wickeln.

Tuch nach 15 - 30 Minuten erneut mit der Lösung anfeuchten. Der Umschlag soll nicht mit wasserundurchlässigem Material abgedeckt werden.

Die Anwendung bei Kindern wird nicht empfohlen aufgrund nicht ausreichender Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit.

Wenn Sie eine größere Menge von EST-Tabletten angewendet haben, als Sie sollten
sind keine Auswirkungen zu erwarten.

Wenn Sie irrtümlich eine EST-Tabletten eingenommen oder die Lösung getrunken haben
Reichlich Trinkwasser (mindestens ½ Liter) nachtrinken.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
Es sind bisher keine Nebenwirkungen bekannt.

5. Wie sind EST-Tabletten aufzubewahren?
Nicht über 25° C lagern.
Da die Tabletten feuchtigkeitsempfindlich sind in der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen. Röhrchen daher stets geschlossen halten.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Außenverpackung angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

6. Weitere Informationen
Was EST-Tabletten enthalten
Die Wirkstoffe sind:
1 Tablette enthält:

Aluminium-Kaliumsulfat	2,40g
Calciumacetat	1,40 g
Calciumcarbonat	0,28g
Weinsäure	0,16g

Die sonstigen Bestandteile sind:
Gebrannter Gips, Kartoffelstärke, mikrokristalline Cellulose, hochdisperses Siliziumdioxid, Magnesiumstearat und Talkum.

Wie EST-Tabletten aussehen und Inhalt der Packung
Weiße, leicht gesprenkelte, runde, Tablette mit 24 mm Durchmesser und 8 mm Höhe in einem weißen Kunststoff-Röhrchen mit dicht schließendem Schnapp-Verschluss.

Packungsgröße
5 Stück

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller
Rösch & Handel GmbH & Co KG, Scheringgasse 2, 1140 Wien

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Jänner 2010

Zulassungsnummer
Z. Nr.: 8.315