

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Maxi-Kalz® Vit.D3 500 mg/400 I.E. - Kautabletten

Wirkstoffe: Calcium und Vitamin D₃

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was sind Maxi-Kalz Vit.D3 - Kautabletten und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Maxi-Kalz Vit.D3 - Kautabletten beachten?
3. Wie sind Maxi-Kalz Vit.D3 - Kautabletten einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Maxi-Kalz Vit.D3 - Kautabletten aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was sind Maxi-Kalz Vit.D₃ - Kautabletten und wofür werden sie angewendet?

Maxi-Kalz Vit.D₃ - Kautabletten sind ein Mineralpräparat mit den Wirkstoffen Calcium (als Calciumcarbonat) und Vitamin D₃ (= Colecalciferol).

Eine ausreichende Zufuhr von Calcium ist von wesentlicher Bedeutung für den Knochen, sowie für die normale Funktion von Nerven und Muskeln.

Vitamin D ist ein Regulator des Calciumstoffwechsels. Es erhöht die Aufnahme des Calciums aus dem Darm.

Maxi-Kalz Vit.D₃ dient zur

- Vorbeugung und Behandlung von Vitamin D- und Calcium-Mangelzuständen bei älteren Menschen.
- Ergänzenden Vitamin D- und Calcium-Behandlung bei Osteoporosepatienten, für die ein Risiko von Vitamin D- und Calcium-Mangelzuständen besteht.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Maxi-Kalz Vit.D₃ - Kautabletten beachten?

Maxi-Kalz Vit.D₃ darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Calcium und Vitamin D₃ oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- bei Krankheitszuständen, die erhöhte Calciumwerte im Blut oder Harn (Hypercalcämie oder Hypercalciurie) zur Folge haben.
- bei Nierensteinen.
- bei Ablagerungen von Calciumsalzen in der Niere (Nephrocalcinose).
- bei Erkrankung infolge von Überdosierung von Vitamin D (Hypervitaminose D).
- bei schweren Nierenfunktionsstörungen und Nierenversagen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Maxi-Kalz Vit.D₃ einnehmen:

- **bei einer Langzeitbehandlung mit Maxi-Kalz Vit.D₃.** Bei einer Langzeitbehandlung sind Laborkontrollen erforderlich, bei denen der Calciumspiegel im Blut und die Nierenwerte zu kontrollieren sind. Halten Sie daher vom Arzt angeordnete Laborkontrollen in Ihrem Interesse ein.
- **wenn Sie mit herzstärkenden Arzneimitteln (Herzglykosiden) oder Entwässerungsmitteln (Diuretika) behandelt werden.** Die Überwachung durch Ihren Arzt ist hier besonders wichtig (siehe Abschnitt 2. „Einnahme von Maxi-Kalz Vit.D₃ zusammen mit anderen Arzneimitteln“).
- **wenn Sie an einer milden bis moderaten Nierenfunktionsstörung leiden.** Ihr Arzt wird Vitamin D bei Ihnen nur mit Vorsicht und unter Überwachung der Calcium- und Phosphatwerte anwenden, um das Risiko von Steinbildungen bzw. Weichteilverkalkung zu berücksichtigen (siehe Abschnitt 3. „Wie ist Maxi-Kalz Vit.D₃ einzunehmen“). Bei schwerer Nierenfunktionsstörung wird Ihnen Ihr Arzt Maxi-Kalz Vit.D₃ nicht weiter verordnen, da das Vitamin D in Form von Colecalciferol in diesem Fall nicht für Ihre Behandlung geeignet ist.
- **wenn Sie eine Neigung zur Nierensteinbildung haben.** Bei erhöhten Calciumblutwerten wird Ihr Arzt die Dosis verringern oder die Behandlung mit Maxi-Kalz Vit.D₃ beenden.
- **wenn Sie an bestimmten Bindegewebserkrankungen (Sarkoidose) leiden.** Ihr Calciumspiegel im Blut und Urin muss regelmäßig kontrolliert werden.
- **wenn Sie infolge länger dauernder Bewegungsunfähigkeit oder hochgradiger Bewegungseinschränkung an Osteoporose erkrankt sind.** Bei Ihnen besteht ein erhöhtes Risiko für zu hohe Calciumwerte im Blut.
- **wenn Sie gleichzeitig bestimmte Antibiotika (Tetrazykline und Chinolone) einnehmen.** Die gleichzeitige Einnahme wird nicht empfohlen bzw. darf nur unter besonderer Vorsicht erfolgen.
- **falls Sie gleichzeitig andere Vitamin D-Präparate oder Calciumpräparate mit Maxi-Kalz Vit.D₃ einnehmen.** Maxi-Kalz Vit.D₃ enthält pro Tablette 400 I.E. Vitamin D₃. Zusätzliche Einnahmen von Calcium oder Vitamin D-Präparaten mit Maxi-Kalz Vit.D₃ sollten Sie nur unter Kontrolle Ihres Arztes durchführen. Eine regelmäßige Kontrolle des Calciumspiegels im Blut und Urin ist gegebenenfalls erforderlich.
- Bei **Schwangeren und Frauen im gebärfähigen Alter ohne gesicherten Empfängnischutz** (wegen der Gefahr von kindlichen Missbildungen) sowie **während der Stillperiode** darf eine Tagesdosis von 600 I.E. Colecalciferol bzw. Ergocalciferol prinzipiell nicht überschritten werden.

Hinweis für Diabetiker:

Maxi-Kalz Vit.D₃ enthält Kohlenhydrate, jedoch weniger als 0,003 BE. Maxi-Kalz Vit.D₃ ist daher für Diabetiker geeignet.

Kinder und Jugendliche

Maxi-Kalz Vit.D₃ ist **nicht für** eine Einnahme durch **Kinder und Jugendliche** vorgesehen.

Einnahme von Maxi-Kalz Vit.D₃ zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben, oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

- **Spezifische Arzneimittel zur Behandlung der Osteoporose:**
Bisphosphonat-Präparate sollten Sie mindestens drei Stunden vor der Einnahme von Maxi-Kalz Vit.D₃ einnehmen, da sonst die Aufnahme dieses Arzneimittels aus dem Magen-Darm-Trakt nur eingeschränkt erfolgen kann.
Die Verabreichung von **Strontiumranelat-Präparaten** und Maxi-Kalz Vit.D₃ sollte im Abstand von zumindest 2 Stunden erfolgen, da eine gleichzeitige Anwendung die Aufnahme von Strontium verringern kann.

- Bei gleichzeitiger Behandlung mit **Eisen-Präparaten** oder **Natriumfluorid-Präparaten** (z.B. zur Vorbeugung von Zahnkaries) sollte die Einnahme zeitlich versetzt im Abstand von mindestens 3 Stunden, bei der Verabreichung von **Zink** von zumindest 2 Stunden erfolgen.
- Bei gleichzeitiger Anwendung von bestimmten **harntreibenden Arzneimitteln** (Thiazid-Diuretika) besteht ein erhöhtes Risiko von zu hohen Calciumwerten im Blut, da diese Arzneimittel die Calciumausscheidung im Harn verringern. Daher ist eine regelmäßige Kontrolle Ihres Blutcalciumspiegels erforderlich.
- Die gleichzeitige Anwendung von bestimmten **Kortisonpräparaten** (systemische Corticosteroide) kann eine erhöhte Dosis Maxi-Kalz Vit.D₃ notwendig machen, da solche Arzneimittel die Calciumaufnahme vermindern.
- Die gleichzeitige Behandlung mit **Colestyramin** (einem Gallensäure-bindenden und somit Cholesterin senkenden Arzneimittel), mit **Abführmitteln** (wie Paraffinöl) oder mit **Orlistat** (zur Gewichtsreduktion) kann die Aufnahme von Vitamin D im Magen-Darm-Trakt vermindern.
- Die Aufnahme von **bestimmten Antibiotika (Tetracycline zum Einnehmen** und sogenannte **Chinolon-Antibiotika**, z.B. Ciprofloxacin) kann durch die gleichzeitige Einnahme von Calciumcarbonat vermindert werden. Aus diesem Grund sollten Sie diese Antibiotika (Tetracyclin-haltige Arzneimittel, Chinolon-Antibiotika) mindestens zwei Stunden vor bzw. vier bis sechs Stunden nach der Einnahme von Maxi-Kalz Vit.D₃ einnehmen.
- Bei gleichzeitiger Behandlung mit **herzstärkenden Arzneimitteln** (Herzglykoside) kann sich deren Giftigkeit (Toxizität) durch erhöhte Calciumwerte im Blut (Hypercalcämie) erhöhen. Ihr Arzt muss Ihre Herzfunktion mittels EKG (Elektrokardiogramm) und den Calciumblutspiegel kontrollieren.
- Bei gleichzeitiger Behandlung mit **Rifampicin** (zur Behandlung von Tuberkulose), bestimmten **krampflösenden/krampfverhindernden Mitteln** (Antikonvulsiva, wie Phenytoin) oder **Schlaf-, Beruhigungs- und Narkosemitteln** (Barbituraten) kann der Vitamin D-Bedarf erhöht sein.
- Bei gleichzeitiger Einnahme von **Levothyroxin** (zur Behandlung der Schilddrüse) und Calcium kann die Wirksamkeit von Levothyroxin verringert sein. Daher sollten zwischen der Einnahme von Maxi-Kalz Vit.D₃ und Levothyroxin mindestens vier Stunden liegen.

Einnahme von Maxi-Kalz Vit.D₃ zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Es können Wechselwirkungen auftreten zwischen Maxi-Kalz Vit.D₃ und Nahrungsmitteln, die Oxalsäure (z. B. in Spinat und Rhabarber) oder Phytinsäure (in Vollkornprodukten) enthalten. Diese Wechselwirkungen führen zu einer Herabsetzung der Calciumaufnahme.

Sie sollten daher während zwei Stunden nach der Aufnahme solcher Nahrungsmittel keine Calciumhaltigen Arzneimittel, wie Maxi-Kalz Vit.D₃, einnehmen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Schwangerschaft:

Während der Schwangerschaft und bei Frauen im gebärfähigem Alter ohne gesicherten Empfängnischutz darf die tägliche Einnahme 1500 mg Calcium und 600 I.E. Vitamin D nicht überschreiten, da sich eine Überdosierung schädlich auf das ungeborene Kind auswirken könnte.

Maxi-Kalz Vit.D₃ - Kautabletten können während der Schwangerschaft bei Calcium- und Vitamin D-Mangel eingenommen werden.

Um eine Tagesdosis von 600 I.E. Vitamin D nicht zu überschreiten, dürfen **Schwangere nur 1 Tablette täglich** einnehmen.

Stillzeit:

Maxi-Kalz Vit.D₃ - Kautabletten können während der Stillzeit eingenommen werden. Eine Tagesdosis von 600 I.E. Vitamin D darf nicht überschritten werden, daher dürfen **Stillende nur 1 Tablette täglich** einnehmen.

Calcium und Vitamin D₃ gehen in die Muttermilch über. Dies ist zu berücksichtigen, wenn das Kind zusätzlich Gaben von Vitamin D erhält.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen durchgeführt. Ein Einfluss ist jedoch unwahrscheinlich.

Maxi-Kalz Vit.D₃ enthält Saccharose, Sorbitol, Isomalt, Aspartam und Natrium

- Maxi-Kalz Vit.D₃ enthält 0,5 mg Aspartam pro Kautablette. **Aspartam** ist eine Quelle für **Phenylalanin**. Es kann schädlich sein, wenn Sie eine Phenylketonurie (PKU) haben, eine seltene angeborene Erkrankung bei der sich Phenylalanin anreichert, weil der Körper es nicht ausreichend abbauen kann.
- Maxi-Kalz Vit.D₃ enthält **Rübenzucker (Saccharose), Sorbitol und Isomalt**. Bitte nehmen Sie Maxi-Kalz Vit.D₃ erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.
- Maxi-Kalz Vit.D₃ enthält weniger als 1 mmol **Natrium** (23 mg) pro Kautablette, d.h. es ist nahezu „natriumfrei“.

3. Wie sind Maxi-Kalz Vit.D₃ - Kautabletten einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene **Dosis** beträgt

- bei Erwachsenen einschließlich älteren Menschen: 2-mal täglich eine Kautablette.
- Schwangere, Stillende und Frauen im gebärfähigen Alter ohne gesicherten Empfängnischutz dürfen eine Tagesdosis von 1 Kautablette nicht überschreiten (siehe Abschnitt „Schwangerschaft und Stillzeit“).
- Kinder und Jugendliche: **Maxi-Kalz Vit.D₃ ist nicht für eine Einnahme durch Kinder und Jugendliche** vorgesehen.

Art und Dauer der Einnahme:

Zum Einnehmen. Die Kautabletten werden zerkaut oder gelutscht.

Vergleichen Sie dazu Abschnitt 2. „Einnahme von Maxi-Kalz Vit.D₃ zusammen mit anderen Arzneimitteln“ und „Einnahme von Maxi-Kalz Vit.D₃ zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken“.

Die Dauer der Einnahme richtet sich nach der Grunderkrankung. Fragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt. Bei einer Langzeitbehandlung sind Laborkontrollen erforderlich, die von Ihrem Arzt angeordnet werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Maxi-Kalz Vit.D₃ eingenommen haben, als Sie sollten

Eine Überdosierung kann zu einem erhöhten Calcium-Spiegel im Blut (Hypercalcämie) und einer Erkrankung, hervorgerufen durch übermäßige Aufnahme von Vitamin D (Hypervitaminose), führen.

Als Beschwerden können Appetitlosigkeit, Durst, Übelkeit, Erbrechen, Verstopfung, Bauchschmerzen, Muskelschwäche, Erschöpfung, Geistesstörungen, vermehrte Flüssigkeitsaufnahme (Polydipsie), vermehrte Harnausscheidung (Polyurie), Knochenschmerzen, Nierensteine und in schweren Fällen Herzrhythmusstörungen auftreten.

Eine extreme Erhöhung des Calciumspiegels im Blut kann lebensbedrohend sein. Ständig erhöhte Calciumspiegel können zu unumkehrbaren Nierenschäden sowie einer Verkalkung der Weichteile

führen. In derartigen Fällen ist ärztliche Hilfe erforderlich.

Wenn Sie die Einnahme von Maxi-Kalz Vit.D₃ vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Die folgende Auflistung zeigt mögliche Nebenwirkungen des Arzneimittels und deren Häufigkeit.

Gelegentlich (kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen):

Erhöhte Calciumspiegel im Blut (Hypercalcämie), erhöhte Calciumwerte im Harn (Hypercalciurie) und das sogenannte Milch-Alkali-Syndrom (auch als Burnett-Syndrom bezeichnet; tritt normalerweise nur nach übermäßiger Calciumeinnahme auf) mit folgenden Beschwerden: häufiger Harndrang, Kopfschmerzen, Appetitverlust, Übelkeit oder Erbrechen, ungewöhnliche Müdigkeit oder Schwäche, zusammen mit erhöhten Calciumblutwerten und Nierenfunktionsstörungen.

Selten (kann bis zu 1 von 1.000 Behandelten betreffen):

Verstopfung, Blähungen, Übelkeit, Bauchschmerzen, Durchfall, Juckreiz, Hautausschlag, Nesselausschlag (Urtikaria).

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar):

Überempfindlichkeitsreaktionen wie Schwellung der Haut oder Schleimhaut, v.a. im Gesichtsbereich (Angioödem) oder Schwellung im Bereich des Kehlkopfes (Larynxödem).

Spezielle Patientengruppen

Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion haben ein erhöhtes Risiko hohe Phosphatspiegel im Blut (normalerweise ohne Beschwerden), Nierensteine und Calciumablagerungen in den Nieren (Anzeichen können Blut im Urin, Rückenschmerzen oder Bauchschmerzen sein) zu entwickeln.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie sind Maxi-Kalz Vit.D₃ - Kautabletten aufzubewahren?

Nicht über 30 °C lagern. In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton, Folienstreifen bzw. Tablettenbehältnis nach „Verw. bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Maxi-Kalz Vit.D₃ enthält

- Die Wirkstoffe sind Calcium und Vitamin D₃.
1 Kautablette zu 1725 mg enthält 1250 mg Calciumcarbonat, entsprechend 500 mg Calcium und 400 I.E. Colecalciferol, entsprechend 10 Mikrogramm Vitamin D₃.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Isomalt, Xylitol, Sorbitol, Citronensäure wasserfrei, Na-Dihydrogencitrat, Magnesiumstearat, Carmellose-Na, hochdisperses Siliciumdioxid, Aspartam (E 951), K-Acesulfam, Pulveraroma Aprikose, All-rac-alpha-Tocopherol, modifizierte Stärke, Saccharose mittelkettige Triglyceride, Natriumascorbat.

Wie Maxi-Kalz Vit.D₃ aussieht und Inhalt der Packung

Maxi-Kalz Vit.D₃ - Kautabletten sind weiße, runde Tabletten mit abgeschrägten Kanten zum Einnehmen.

Maxi-Kalz Vit.D₃ ist erhältlich als Packung mit Folienstreifen mit 8, 10, 12, 20, 28, 30 (2 x 15), 56, 60 (3 x 20) oder 120 (6 x 20) Stück und als Tablettenbehältnis mit 8, 10, 12, 20, 28, 30 (2 x 15), 56, 60 (3 x 20) oder 120 (6 x 20) Stück.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer

Viatrix Austria GmbH
1110 Wien

Hersteller

HERMES PHARMA GmbH, 82515 Wolfratshausen, Deutschland

Z.Nr.: 1-25150

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Jänner 2024.