

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Dr. Böhm Mönchspfeffer 4 mg – Filmtabletten

(Wirkstoff: Mönchspfefferfrüchte-Trockenextrakt)

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Dr. Böhm Mönchspfeffer 4 mg- Filmtabletten jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach einigen Wochen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind Dr. Böhm Mönchspfeffer 4 mg - Filmtabletten und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme beachten?
3. Wie sind Dr. Böhm Mönchspfeffer 4 mg - Filmtabletten einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Dr. Böhm Mönchspfeffer 4 mg - Filmtabletten aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS SIND DR. BÖHM MÖNCHSPFEFFER 4 mg - FILMTABLETTEN UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

Dr. Böhm Mönchspfeffer 4 mg - Filmtabletten sind ein pflanzliches Arzneimittel zur Behandlung bei Regelbeschwerden. Sie werden bei Rhythmusstörungen der Regelblutung (Regeltempoanomalien), Spannungs- und Schwellungsgefühl in den Brüsten (Mastodynie), monatlich wiederkehrenden Beschwerden vor Eintritt der Regelblutung (prämenstruelles Syndrom) angewendet.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON DR. BÖHM MÖNCHSPFEFFER 4 mg – FILMTABLETTEN BEACHTEN?

Dr. Böhm Mönchspfeffer 4 mg - Filmtabletten dürfen nicht eingenommen werden wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Mönchspfeffer oder einen der sonstigen Bestandteile von Dr. Böhm Mönchspfeffer 4 mg – Filmtabletten sind.

Weiters bei Hypophysentumoren (Geschwülste der Hirnanhangsdrüse) und Mammakarzinom (Brustkrebs).

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Dr. Böhm Mönchspfeffer 4 mg - Filmtabletten ist erforderlich,

wenn die Beschwerden andauern oder sich verschlechtern. In diesen Fällen ist ärztliche Beratung einzuholen.

Für Kinder ungeeignet.

Bei Einnahme von Dr. Böhm Mönchspfeffer 4 mg - Filmtabletten mit anderen Arzneimitteln

informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich nicht um ein verschreibungspflichtiges Medikament handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Dr. Böhm Mönchspfeffer 4 mg- Filmtabletten sollen während der Schwangerschaft nicht angewendet werden.

Eine Anwendung in der Stillzeit kann die Stillleistung beeinträchtigen.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es gibt keine Hinweise auf eine Beeinträchtigung des Verhaltens im Straßenverkehr oder beim Bedienen von Maschinen.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Dr. Böhm Mönchspfeffer 4 mg - Filmtabletten

Dieses Arzneimittel enthält pro Tablette 143 mg Lactose und 38 mg Glucose. Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

3. WIE SIND DR. BÖHM MÖNCHSPFEFFER 4 mg - FILMTABLETTEN EINZUNEHMEN ?

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis für Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene einmal täglich 1 Filmtablette.

Für dieses Arzneimittel gibt es keine Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren.

Dr. Böhm Mönchspfeffer 4 mg - Filmtabletten sollen möglichst immer zur gleichen Tageszeit eingenommen werden.

Für eine zuverlässige Wirkung sollten Dr. Böhm Mönchspfeffer 4 mg - Filmtabletten über mindestens 3 Monatszyklen eingenommen werden. Mit einem Wirkungseintritt ist erst nach einigen Wochen zu rechnen.

Wenn Sie eine größere Menge von Dr. Böhm Mönchspfeffer 4 mg - Filmtabletten eingenommen haben, als Sie sollten sind keine Risiken zu erwarten.

Wenn Sie die Einnahme von Dr. Böhm Mönchspfeffer 4 mg - Filmtabletten vergessen haben, holen Sie diese Einnahme nicht nach, sondern fahren mit der nächsten Einnahme fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel können Dr. Böhm Mönchspfeffer 4 mg - Filmtabletten Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Vorübergehender Kopfschmerz, Störungen im Magen-Darm-Trakt, Übelkeit, Akne, juckende Hautausschläge, vorübergehende Unruhe und Verwirrheitszustände wurden beobachtet.

Die Häufigkeit des Auftretens ist nicht bekannt.

Beim Auftreten von Nebenwirkungen ist das Präparat abzusetzen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.

5. WIE SIND DR. BÖHM MÖNCHSPFEFFER 4 mg - FILMTABLETTEN AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis nach „Verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Dr. Böhm Mönchspfeffer 4 mg - Filmtabletten enthalten:

Der Wirkstoff pro Tablette ist:

4 mg Trockenextrakt aus Mönchspfefferfrüchten (Agni casti fructus, Keuschlammfrüchte) Droge-Extrakt-Verhältnis 7 - 13:1, Auszugsmittel: Ethanol 60 % (m/m)

Die sonstigen Bestandteile sind:

Tablettenkern: Glucosesirup, Maisstärke, Magnesiumstearat, hochdisperses Siliciumdioxid, mikrokristalline Cellulose, Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A), Lactose.

Tablettenüberzug: Hypromellose, Macrogol 4000, Lactose, Titandioxid (E 171), Eisen(III)-oxid (E 172).

Wie sehen Dr. Böhm Mönchspfeffer 4 mg - Filmtabletten aus und Inhalt der Packung?

Dr. Böhm Mönchspfeffer 4 mg - Filmtabletten sind lachsrosafarbene, runde Tabletten mit einer einseitigen Kerbe, die nicht zum Teilen dient.
Sie sind in Aluminium/PVC-Blisterstreifen in Packungen zu 60 Stück erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Apomedica Pharmazeutische Produkte GmbH
Roseggerkai 3
A-8011 Graz.

Z.Nr.: 1-27341

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im April 2008