

## **PACKUNGSBEILAGE**

## **Gebrauchsinformation: Information für Patienten**

### **Spenglersan® Kolloid G – Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung**

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht:**

1. Was ist Spenglersan Kolloid G und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Spenglersan Kolloid G beachten?
3. Wie ist Spenglersan Kolloid G anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Spenglersan Kolloid G aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist Spenglersan Kolloid G und wofür wird es angewendet?**

Spenglersan Kolloid G ist eine homöopathische Arzneispezialität.

Spenglersan Kolloid G ist ein homöopathisches Kombinationsarzneimittel der Therapierichtung nach Dr. Spengler, daraus leiten sich auch die Anwendungsgebiete ab. Spenglersan Kolloid G ist eine Nosode, das ist ein potenziertes Wirkstoff, hergestellt aus Erregern oder Ausscheidungen infektiöser Krankheiten oder Krankheitserregern.

Das therapeutische Grundprinzip beruht darauf, akute und chronische Belastungen zu vermindern, indem sogenannte Schlüsseltoxine mit Hilfe des verdünnten Giftstoffes neutralisiert und aus dem Gewebe ausgeschwemmt werden sollen. Dadurch soll ein abgekürzter Krankheitsverlauf bei gleichzeitiger Entlastung und Reaktivierung der Zwischenzellsubstanz erwirkt werden.

Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:

Leichte Formen von Erkältungskrankheiten wie grippaler Infekt und Schnupfen, Hauterkrankungen wie Entzündung, Ekzem, Furunkel, Akne.

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels der Therapierichtung nach Dr. Spengler in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Dieses Arzneimittel wird angewendet bei Erwachsenen.

Wenn Sie sich nach 5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Spenglersan Kolloid G beachten?**

**Spenglersan Kolloid G darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Antigene aus Virus influenzae, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Antitoxine gegen Virus influenzae, Haemophilus influenzae, Klebsiella

pneumoniae, oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Spenglersan Kolloid G anwenden.

Falls sich der Allgemeinzustand des Patienten verschlechtert, Fieber, Atemnot oder ein Ausschlag am ganzen Körper auftritt, oder Hautschwellungen, Schluckbeschwerden, oder Augenschmerzen oder Sehstörungen, ist unverzüglich ein Arzt um Rat zu fragen.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten. Solche Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab.

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine längerdauernde Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel der Therapierichtung nach Dr. Spengler von einem entsprechend erfahrenen Arzt kontrolliert werden.

### **Kinder und Jugendliche**

Die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren wird aufgrund fehlender Daten nicht empfohlen.

### **Anwendung von Spenglersan Kolloid G zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Es wurden keine Studien zur Erfassung von Wechselwirkungen durchgeführt.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Es liegen keine ausreichenden Daten zur Anwendung dieses Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit vor. Bei der Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit ist Vorsicht geboten.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

## **3. Wie ist Spenglersan Kolloid G anzuwenden?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

**Erwachsene:**

3 x täglich 10 Sprühstöße

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

**Art der Anwendung**

Zur Anwendung auf der Haut

Auf die Innenseite des Ellenbogens aufsprühen und einreiben

Halten Sie beim Sprühen die Flasche senkrecht und betätigen Sie vor dem erstmaligen Benutzen mehrfach den Sprühmechanismus bis zum Austritt eines feinen Nebels.

Bei Anwendung mehrerer Spenglersan Kolloide sollen diese in einem Abstand von mindestens 2 Stunden oder im täglichen Wechsel angewendet werden.

**Dauer der Anwendung**

Wenn Sie sich nach 5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

**Anwendung bei Kindern und Jugendlichen**

Die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren wird aufgrund fehlender Daten nicht empfohlen.

**Wenn Sie eine größere Menge von Spenglersan Kolloid G angewendet haben als Sie sollten**

Es sind keine Fälle von Überdosierung bekannt.

**Wenn Sie die Anwendung von Spenglersan Kolloid G vergessen haben**

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

**4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bisher wurden keine Nebenwirkungen bekannt.

**Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. Wie ist Spenglersan Kolloid G aufzubewahren?**

Nicht über 25°C lagern.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und Etikett nach "Verwendbar bis:" angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was Spenglersan Kolloid G enthält:**

100 g Spenglersan Kolloid G enthalten:

Die Wirkstoffe sind:

- Influenza virus A Antigene nach Spengler ad usum externum Dil. D9 16,648 g
- Haemophilus influenzae Antigene nach Spengler ad usum externum Dil. D9 16,648 g
- Klebsiella pneumoniae Antigene nach Spengler ad usum externum Dil. D9 16,648 g
- Influenza virus A Antitoxine nach Spengler ad usum externum Dil. D9 16,648 g
- Haemophilus influenzae Antitoxine nach Spengler ad usum externum Dil. D9 16,648 g
- Klebsiella pneumoniae Antitoxine nach Spengler ad usum externum Dil. D9 16,648 g

Die sonstigen Bestandteile sind:

- Thymol, Salzsäure 25% (m/V) und gereinigtes Wasser.

1 Sprühstoß entspricht 0,05 ml Lösung

### **Wie Spenglersan Kolloid G aussieht und Inhalt der Packung**

Spenglersan Kolloid G ist ein Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung und in Sprühflaschen mit 10 ml, 20 ml, 50 ml und 100 ml erhältlich. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

Spenglersan GmbH, Steinfeldweg 13, 77815 Bühl, Deutschland

Tel.: 0049722330671

E-Mail: info@spenglersan.de

**Z. Nr.:** 3-00167

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im März 2019.**